

## Состав и форма выпуска

Капли для глаз Иридина Две с пипеткой во флаконе 10 мл.

В одном миллилитре содержится 0,05% действующего компонента — нафозолина гидрохлорида.

## Фармакологическое действие

Капли Iridina промывают глаза, отбеливают, убирают покраснения и желтизну. Также капли для глаз Иридина убирают усталость и увлажняют глаза. После закапывания капель в глаза их действие наступает сразу же, и эффект сохраняется на несколько часов.

## Показания к применению

Иридина две можно применять при:

- раздражение глаз;
- появившемся жжении и зуде;
- покраснение глазных яблок;
- обильном слезотечении;
- недостатке влаги в глазу, то есть сухости;
- высокой чувствительности к яркому свету;
- чувство усталости глаз;
- чувство дискомфорта в глазах.

## Способ применения и дозы

При раздражении конъюнктивы по 1-2 капли в каждый глаз до 6 раз в день, курс лечения 2-3 дня

Для снятия усталости и покраснения при симптоматическом лечении 1-2 капли в каждый глаз, но не чаще 3-4 раз в неделю.

## Противопоказания

Глазные капли Иридина Дуе противопоказаны при:

- имеющейся непереносимости компонентов, входящим в состав капель;
- глаукоме.

А также детям и подросткам в возрасте до двенадцати лет.

## **Побочные действия**

Глазные капли Иридина Дуе являются не токсичными, совершенно безопасными и, как правило, побочных действий не оказывают. Но в единичных случаях во время превышения допустимой дозировки наблюдались такие симптомы как:

- увеличение внутриглазного давления;
- небольшая головная боль;
- повышение артериального давления.

## **Беременность и кормление грудью**

Не ограничивать использование во время беременности и лактации. Побочные действия

Повышение внутриглазного давления, гипертония, тошнота, головная боль, болезни сердца.

## **Передозировка**

В случае передозировки при пероральном применении могут быть признаки депрессии на уровне центральной нервной системы, чувство холода на коже, тахикардия, сонливость, потливость, а также помрачение сознания.

## **Взаимодействие**

Применять с осторожностью в случае лечения с антидепрессантами.

## **Особые указания**

Если вы носите контактные линзы, то перед началом процедуры их следует извлечь, а одеть заново можно только через 15-20 минут после закапывания.

Не рекомендуется совмещать капли Иридина Дуе и другие антисептические средства для лечения глаз.

Не допускать прямого попадания на флакон солнечных лучей.

После открытия использовать капли в течение одного месяца. Если по истечению одного месяца капли во флаконе еще остались, то использовать их категорически запрещено.

## **Условия хранения**

После вскрытия флакона хранить не более 28 суток при температуре не выше 25 градусов.

## **Условия продажи**

По рецепту.